


Mal de dents



URGENCE, APPELEZ LE 911

- Vous n'êtes pas capable d'ouvrir ou de fermer la bouche.
- Vous avez de la fièvre, et votre joue, votre nez ou votre œil sont enflés.
- Vous avez mal à plusieurs dents, à la mâchoire, au bras ou dans la poitrine.
- Vous avez mal à la tête et un problème de vue.

Quand voir un dentiste en urgence

- Vous avez mal aux dents et vous faites de la fièvre.
- La douleur ne disparaît pas après 2 jours.
- La douleur devient insupportable.
- La joue ou la gencive sont enflées.
- En plus du mal de dents, vous avez mal à la tête ou dans l'oreille.

Les personnes de 65 ans et plus ou de moins de 18 ans peuvent être admissibles à des soins dentaires plus abordables. Informez-vous sur le Régime canadien de soins dentaires ou à votre dentiste.

Comment avoir de l'aide


- 24 h sur 24, composez le 811
- Appelez votre dentiste. Certaines cliniques sont ouvertes jour et nuit.
- Appelez votre pharmacien.
- Prenez rendez-vous à votre clinique médicale.
- Si vous n'avez pas de médecin, composez le 811 option 3.
- Trouvez un rendez-vous sur rvsq.gouv.qc.ca

Ce guide ne remplace en aucun cas les conseils d'un professionnel de la santé et ne se substitue pas à des soins médicaux.

Tous les contenus sont disponibles sur monproblemedesante.ca

Le mal de dents peut être très douloureux et vous empêcher de manger ou de dormir.

Quoi faire à la maison



Rinçage de la bouche : Faites bouillir de l'eau que vous versez dans un verre. Ajoutez une cuillère à thé de sel dans l'eau et mélangez bien. Une fois l'eau tiède, rincez-vous la bouche plusieurs fois par jour.



Froid : Mettez un sac de glace ou un linge froid sur votre joue pendant 15 minutes, plusieurs fois par jour.



Médicaments : Prenez des médicaments comme l'acétaminophène (Tylenol^{MD}) ou l'ibuprofène (Advil^{MD}). Suivez les instructions et demandez conseil à votre pharmacien.



Aliments à éviter : Évitez de manger des aliments très chauds, très froids ou durs.



Hygiène : Continuez de vous brosser les dents doucement. Utilisez du fil dentaire pour enlever les aliments coincés.

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de l'Est-de-
l'Île-de-Montréal

Québec 